

岡山市子どもの予防接種の種類とスケジュール(H28.4.1版)

→標準的な接種年齢

→対象年齢(法定年齢)

ワクチン	種類	標準的な接種年齢 (接種可能な年齢)	スケジュール例													接種チェック欄									
			乳児期					幼児期			学童期														
			0~1 か月	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6~7 か月	8~11 か月	12~15 か月	16~17 か月	18~23 か月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳 以降	
ヒブ (インフルエンザ 菌b型)	不活化	生後2~7か月未満 (生後2か月~5歳未満)		1回目	2回目	3回目				4回目			・接種開始月齢 2~7か月未満 初回3回 追加1回 ・接種開始月齢 7~12か月未満 初回2回 追加1回		・接種開始年齢 1~5歳未満 1回									<input type="checkbox"/> 1回目(. . .) <input type="checkbox"/> 2回目(. . .) <input type="checkbox"/> 3回目(. . .) <input type="checkbox"/> 4回目(. . .)	
小児用肺炎球菌	不活化	生後2~7か月未満 (生後2か月~5歳未満)		1回目	2回目	3回目				4回目			・接種開始月齢 2~7か月未満 初回3回 追加1回 ・接種開始月齢 7~12か月未満 初回2回 追加1回		・接種開始年齢 1~2歳未満 2回 ・接種開始年齢 2~5歳未満 1回									<input type="checkbox"/> 1回目(. . .) <input type="checkbox"/> 2回目(. . .) <input type="checkbox"/> 3回目(. . .) <input type="checkbox"/> 4回目(. . .)	
BCG	生	生後5~8か月未満 (生後0~12か月未満)						1回	1回接種																<input type="checkbox"/> (. . .)
四種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ)	不活化	<I期初回> 生後3~12か月 (生後3~90か月未満) <I期追加> I期初回終了から12~18か月後 (生後90か月未満) (初回終了から少なくとも6か月はあける)			1回目	2回目			3回目																<input type="checkbox"/> 1回目(. . .) <input type="checkbox"/> 2回目(. . .) <input type="checkbox"/> 3回目(. . .) <input type="checkbox"/> 4回目(. . .)
水痘	生	1~3歳未満 (2回目は初回終了から少なくとも3か月あける)								1回目		2回目													<input type="checkbox"/> 1回目(. . .) <input type="checkbox"/> 2回目(. . .)
麻疹・風しん	生	<I期> 1~2歳未満 <II期> 5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間								1回目		1回接種													<input type="checkbox"/> I期(. . .) <input type="checkbox"/> II期(. . .)
二種混合	不活化	<II期> 11歳 (11~13歳未満)																							<input type="checkbox"/> (. . .)
日本脳炎	不活化	<I期初回> 3歳(生後6~90か月未満) <I期追加> 4歳(生後90か月未満) ※初回終了から少なくとも6か月あける <II期> 9歳(9~13歳未満) ※いずれも4~6月が望ましい											1回目	3回目											<input type="checkbox"/> 1回目(. . .) <input type="checkbox"/> 2回目(. . .) <input type="checkbox"/> 3回目(. . .) <input type="checkbox"/> 4回目(. . .)
日本脳炎 特例対象者		「H19.4.1以前」生まれの方 I期及びII期の不足回数(1~4回)を20歳未満まで接種することができます。 「H19.4.2~H21.10.1」生まれの方 I期の間に接種が完了しなかった場合、II期の対象年齢の間にI期不足分接種が可能																							<input type="checkbox"/> 1回目(. . .) <input type="checkbox"/> 2回目(. . .) <input type="checkbox"/> 3回目(. . .)
子宮頸がんワクチン (HPV) (積極的勧奨差し控 中)	不活化	中学1年生 (小学6年生〔12歳相当〕~高校1年生〔16歳相当〕の女子)																							<input type="checkbox"/> 1回目(. . .) <input type="checkbox"/> 2回目(. . .) <input type="checkbox"/> 3回目(. . .)

※不活化ワクチン…不活化ワクチンを接種した日から別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、6日以上空ける必要があります。

生ワクチン…生ワクチンを接種した日から別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、27日以上間隔を空ける必要があります。

※接種費用は対象年齢内であれば、すべて無料です。予防接種はいずれも個別接種となっています。

※現在、四種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)の供給量が確保されていることから、三種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風)は製造されておりません。

三種混合ワクチンを接種する場合は、ワクチンの取り寄せに時間がかかりますので、早めに医療機関へ予約を入れてください。

